

Hälsoundersökning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare

Hälsoundersökning syftar till att erbjuda vård samt uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat). Screening för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I undersökningen ingår hälsosamtal, vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Hälsoundersökningen är också viktig för att ge information om svensk hälso- och sjukvård. Barn och ungdomar <18 år samt gravida bör prioriteras och få genomgå hälsoundersökning i tidigt skede efter ankomst till Sverige.

Hälsosamtal

Följande delar bör ingå ur smittskyddssynpunkt;

- **Socialt** familjeförhållanden, antal boende i bostaden, barn, vistelse fängelse, flyktingläger eller socioekonomiskt utsatt bakgrund.
- **Tidigare sjukdomar** inklusive tuberkulosanamnes¹, sjukhusvård, ev. missbruk, kvinnors obstetriska förhållanden, ev. undernäring
- **Aktuellt** framförallt svalg/luftvägssymtom (difteri, pneumoni, TB), tarmsymtom (parasiter, bakterier), sår- hudinfektioner (MRSA)
- **Vaccinationsanamnes**, se nedan

¹ med tuberkulosanamnes menas: kontakt med tuberkulos, hosta, feberperioder, avmagring, nattliga svettningar, lymfkörtelsvullnad, bröst/ryggsmärtor, hud- mjukdelsabscesser.

Vaccinationer

Vaccinationsanamnes ingår som del i hälsoundersökning hos barn upp till 18 års ålder.

Barn ska erbjudas ingå i barnvaccinationsprogrammet enligt riktlinjer fastställda i Region Örebro läns vaccinationsgrupp. Se Rikshandboken, Barnhälsovårdens [hälsoundersökning av barn som nyligen kommit till Sverige](#).

BCG Erbjuds barn till 6 års ålder. Notera BCG-ärr.

Rekommenderad provtagning

Prov* Vem undersöks?

<i>Hiv, Hepatit B, Hepatit C</i>	Alla Vuxna: Beställ S-Blodsmitta (Hepatit B, och C, HIV) Barn <18 år: Beställ uppföljning Hepatit B (AntiHBs, AntiHBc, HBs-ag), Hepatit C, HIV
<i>Faecesparasiter PCR, cystor och maskägg IGRA eller TST</i>	Vid symptom Personer från högriskländer gällande TB-incidens (>100 fall/100.000) eller annan riskmiljö såsom flyktingläger, fängelse eller socioekonomiskt utsatt bakgrund
<i>Syfilis (VDRL)</i>	Gravida samt vid misstanke om syfilis eller annan sexuellt överförbar infektion
<i>MRSA sårodling MRB-screening</i>	Infekterade sår, bölder, infekterade eksem Personer som förväntas ha behov av upprepade sjukhuskontakter/ inneliggande vård.

Övriga prover som rekommenderas (ej smittskyddsskäl)

<i>PKU</i>	Barn under 9 år
<i>Hb</i>	Barn under 18 år

Vad gäller vid positivt prov?

<i>HIV</i>	Konfirmerande prov tas, telefonkontakt och remiss till barn- eller infektionsklinik
<i>HBsAg**</i>	Barn: Remiss barnklinik Vuxna \geq 18 år: Information och förhållningsregler. Smittskyddsanmälan. Remiss infektionsklinik.
<i>Anti-HBs**</i>	Informera om immunitet, ej behov av vaccination. Om neg Anti-HBs hos barn < 18 år erbjuds vaccination.
<i>Anti-HCV**</i>	Laboratoriet analyserar HCV-RNA. Om HCV-RNA är positivt: Barn: Remiss barnklinik Vuxna \geq 18 år: Information och förhållningsregler. Smittskyddsanmälan. Remiss infektionsklinik.
<i>Faecesparasiter PCR, Cystor/maskägg IGRA eller TST</i>	Remiss barnklinik eller primärvård för behandling och fortsatt omhändertagande. Se särskild rutin handläggning vid positivt svar
<i>Syfilis (VDRL)</i>	Remiss STI-mottagning
<i>MRB inkl. MRSA</i>	Se särskild rutin vårdhygiens hemsida

*Vid hälsoundersökning kan framkomma specifik epidemiologisk situation som föranleder ytterligare provtagning.

**Tolkning av hepatit B och C markörer se [PM](#)