

## Virussakad gastroenterit provtagningsanvisning, vårdhygienisk riktlinje

### Ta prov från 2-3 akut sjuka vårdtagare på varje avdelning för att bekräfta ett utbrott.

Prov tas för gastroenteritvirus. För att utesluta andra orsaker till vårdtagarens symtom bör prov för övriga tarmpatogener tas. Vid provtagning analyseras även andra gastroenteritvirus än noro- och sapovirus (dvs calicivirus). Oavsett vilket virus som orsakar sjukdom ska patienten vårdas efter symtom och kohortvård ska bedrivas tills 48 h efter symtomfrihet. Vid negativt provsvar och efter klinisk bedömning bör även prov för *Clostridoides difficile* övervägas.


Faeces är rekommenderat provmaterial. Calicivirus kan även påvisas i kräkning, men det är vanligen ett sämre provmaterial på grund av lägre virusmängder. Burk med sked och skruvlock måste användas, pinnprov går inte att analysera.

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Transporttiden skall hållas så kort som möjligt. Proverna lämnas till Mikrobiologen, USÖ. Endast prov för gastroenteritvirus kan lämnas till provmottagningen, M-huset, USÖ.

**E-remiss används i första hand, om möjligt. Använd annars pappersremiss från sidan [Remissinformation och blanketter, Remisser för utskrift](#), se nedan.**

**1) En burk med sked o skruvlock, 1 ml faeces, för gastroenteritvirus**

Remiss: Analysbeställning, Mikrobiologi och immunologi, *Gastroenteritvirus*



**2) Ett pinnprov för tarmpatogener, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobakter**

Remiss: Analysbeställning, odling, *Faeces-odling*



**3) En burk med sked o skruvlock, 1 ml faeces, för *Clostridoides difficile***

Remiss: Analysbeställning, odling, *Faeces-C.difficile*

